

新一代SHINGRIX  
帶狀疱疹  
(生蛇)  
疫苗注射計劃

VACC13042-P2

- 預防帶狀疱疹有效率  
超過90%
- SHINGRIX有助於防止  
50歲及以上成年人感染  
帶狀疱疹。
- 適用於18歲以上高風險人士  
及50歲或以上人士接種



# 關於帶狀皰疹

## 什麼是帶狀皰疹病毒？

水痘-帶狀皰疹病毒也稱為帶狀皰疹病毒，是導致水痘的相同病毒。

若您患過水痘，那麼您的免疫系統就能夠抑制帶狀皰疹病毒。

但是，隨著年齡的增長，我們的免疫系統會日漸衰弱。帶狀皰疹病毒就可能重新啟動，從而提高帶狀皰疹的發病風險。



## 帶狀皰疹有哪些癥狀？


帶狀皰疹可導致持續數周的疼痛和體表皰疹的出現。

- 帶狀皰疹可能引發劇烈的疼痛、失能且可能干擾正常的日常活動，包括步行、睡眠和社交活動。
- 也可能導致嚴重的併發症，如持續數月或數年的長期神經痛（也稱為帶狀皰疹後神經痛或PHN）。

其他癥狀可能包括：

- 灼痛感、麻木或刺痛
- 觸摸敏感
- 發燒
- 頭痛
- 視力問題
- 聽力障礙


## 帶狀皰疹是什麼樣的？



# 點解要打 「蛇針」

即使曾經「生蛇」也有機會復發

即使感覺健康，仍有機會生蛇



## 什麼是「生蛇」？

「生蛇」（醫學名稱：帶狀皰疹）是指患者身上會出現一種令人感到痛楚而呈帶狀的紅疹，並帶有水泡。


「生蛇」由水痘病毒引起。在水痘癒合後，病毒會潛藏於人體神經裡處休眠狀態，但日後隨時會再度活躍，引致生蛇。因此，凡感染過水痘的人都有機會生蛇！

一旦發病，病毒會沿著脊髓神經去到連接皮膚的表面，形成紅疹。最常見的發病位置是背部及腰部的一側，亦有可能出現在頭頸和臉部。



# 我有生蛇的風險嗎？

帶狀疱疹多發生在50歲以上成人、有帶狀疱疹病史者、及免疫功能低下族群，如人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者、癌症、糖尿病、心血管疾病、腎病、呼吸系統疾病、類風濕關節炎、壓力過大、睡眠障礙、有帶狀疱疹家族史等。




#病人為70歲或以上

## 生蛇非常可怕？

「生蛇」產生的痛楚嚴重程度難以預測，病情可持續4星期，嚴重影響日常生活。

「生蛇」可在任何時間病發及有機會復發，影響日常生活及工作，不想重複經歷劇痛及不適。



**請及早向醫生查詢預防方法！**

# SHINGRIX

一種被證明預防帶狀皰疹

有效率超過**90%**的疫苗



SHINGRIX是一種有助於保護成年人抵抗帶狀皰疹的疫苗(也稱為水痘-帶狀皰疹)。隨著年齡的增長，患帶狀皰疹的風險增加。SHINGRIX可用於50歲以上的成年人，以幫助身體抵禦帶狀皰疹。

在臨床試驗中，SHINGRIX被證實對50歲及以上人群感染帶狀皰疹的預防有效率**超過90%**。SHINGRIX提供十年的持續保護。

# 常見問題

## ◆ 帶狀皰疹有哪些癥狀？

帶狀皰疹可導致持續數周的疼痛、體表出現泡疹。其他癥狀可能包括：

- 灼痛感、麻木或刺痛
- 觸摸敏感
- 發燒
- 頭痛
- 視力問題
- 聽力障礙

## ◆ 您有罹患帶狀皰疹的風險嗎？

若您患過水痘，您可能曾患上帶狀皰疹。

## ◆ 水痘病毒就是帶狀皰疹病毒嗎？

是的，水痘和帶狀皰疹同為水痘-帶狀皰疹病毒引發。

## ◆ SHINGRIX能否預防水痘？

不，SHINGRIX僅用於幫助50歲及以上人群預防感染帶狀皰疹。

## ◆ 誰應該接種SHINGRIX？

18歲以上高風險人士及50歲或以上人士可接種SHINGRIX預防帶狀皰疹。如對疫苗中的任何成分過敏或藥物有過敏反應，可諮詢您的醫療保健專業人員SHINGRIX是否適合您。

## ◆ SHINGRIX有效性持續多久？

臨床試驗結果顯示，SHINGRIX在第一劑和最後一劑注射完成後七年內有效。

## ◆ 帶狀皰疹會復發嗎？

帶狀皰疹是水痘病毒的重新啟動，這種病毒可能不止一次發作。

## ◆ SHINGRIX含有病毒的活性成分嗎？

SHINGRIX是一種非活性疫苗（在SHINGRIX疫苗中未包含病毒的活性成分）。

## ◆ 要達到最大保護效果，需要多少劑量的SHINGRIX？

SHINGRIX有兩次注射，兩劑之間間隔時間為2到6個月。第一劑可以從50歲開始。確保您收到兩種劑量的SHINGRIX。這可以讓SHINGRIX的保護效果達到最大化。

## ◆ 已經注射過舊款蛇針人士，需要再接再種SHINGRIX嗎？

### 兩者需要相隔多久才能重新接種？

需要，舊款蛇針與SHINGRIX兩者需相隔至少8個星期\*。

## ◆ 接種SHINGRIX有什麼注意事項？

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接再種。懷孕婦女應避免接種。

## ◆ 接種SHINGRIX後，會否出現副作用？

會出現輕微的副作用，而且是暫時性。接種部位可能有發紅、疼痛或腫脹等局部反應。接種SHINGRIX後，可能有頭痛、四肢疼痛、發燒、疲倦等全身性反應。

# 帶狀疱疹 疫苗



# 新一代 SHINGRIX 帶狀疱疹疫苗

MSD

製造藥廠

GSK

帶狀疱疹滅活疫苗

疫苗種類

結合了一種非活抗原  
(帶狀疱疹病毒gE蛋白)  
和一種專用佐劑系統  
AS01B的帶狀疱疹疫苗

51%

預防「生蛇」  
總效能

97.2%

67%

帶狀疱疹後  
神經痛預防率

>90%

1劑皮下注射

接種次數

2劑肌肉注射  
(每劑相距2-6個月)

注射部位疼痛/腫脹、  
頭痛或發燒

常見副作用

注射部位疼痛/腫脹、  
頭痛、發燒、肌肉痛  
或疲勞

即使已接種過康柏苗，50歲以上的成年人也可再接再種SHINGRIX，兩者需相隔至少8個星期。

Q 搜尋 | 香港仁和reHEALTH 立即關注



EC Healthcare  
醫思健康  
HKEx Stock Code: 2138

- 旺角店 香港九龍旺角朗豪坊辦公大樓11及12樓  
銅鑼灣店 香港銅鑼灣告士打道280號  
世貿中心34樓3401-03室
- 會員專線 旺角店 +852 2156 5856  
銅鑼灣店 +852 2152 8582

- www.rehealth.com.hk
- rhinfo@rehealth.com.hk
- 香港仁和體檢

香港服務名牌  
HONG KONG TOP  
SERVICE BRAND



2018  
最受醫藥人信賴  
醫藥中心品牌大獎

L20210729