



多一種選擇 · 添一份安心

醫思健康旗下醫療中心  
提供接種  
復必泰新冠疫苗

復星醫藥/德國藥廠BioNTech

**復必泰** (BNT 162b2)  
**Comirnaty**



接種中心



香港仁和體檢 re: HEALTH

銅鑼灣告士打道280號世貿中心34樓3401-03室

醫思健康醫療中心 EC Healthcare Medical Centre

太古英皇道1111號太古城中心一期14樓01-03室

中環干諾道中19-20號馮氏大廈7樓

智健康 AI Medical

九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓54樓

九龍觀塘協和街169-197號合和大廈地下26號舖

九龍深水埗桂林街143號H座地下F1-F2號舖

荃灣荃豐中心1樓B82號舖

大埔太和路15號太和中心18號地舖

青衣楓樹窩路10號青衣邨青衣商場1樓9號

屯門良景邨良景廣場L2樓L231號舖



WhatsApp 查詢 Inquiry

3001 6768




## 1 甚麼是「復必泰」及其用途

「復必泰」是適用於預防由SARS-CoV-2 病毒引起的 COVID-19 的疫苗。

成人和12歲及以上的青少年可接種成人劑量的「復必泰」。

本疫苗可使免疫系統（人體的天然防禦系統）產生對抗該病毒的抗體和血細胞，從而預防COVID-19。

由於「復必泰」不含有產生免疫力的病毒，故不會導致COVID-19。



## 2 在使用「復必泰」前，需要瞭解甚麼事項

不應給予「復必泰」<sup>1</sup>

- 如果您曾對「復必泰」或其活性物質或其他成分\*有過敏反應

\*包括：[(4-羥丁基)氮雜二基]雙(己烷-6,1-二基)雙(2-己基癸酸酯)(ALC-0315)/  
2-[ (聚乙二醇)-2000]-N,N-二十四烷基乙醯胺 (ALC-0159) /  
1,2-二硬脂醯-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 (DSPC) / 膽固醇/  
氯化鉀/磷酸二氫鉀/氯化鈉/磷酸氫二鈉二水合物/蔗糖/注射用水



警告和注意事項<sup>1</sup>

如果您有以下情況，使用本疫苗前，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士：

- 以往在接種「復必泰」或任何其他疫苗後，您曾出現過嚴重過敏反應或呼吸問題。
- 您對疫苗接種過程感到焦慮，或曾在任何針頭注射後暈倒。
- 患有嚴重疾病或伴有高燒的感染。如出現發熱情況，請延後疫苗接種。
- 有出血問題，容易出現瘀青或正在使用預防血凝塊的藥物。
- 由於HIV 感染等疾病或使用影響免疫系統的藥物（如皮質類固醇），令您的免疫系統減弱。

<sup>1</sup> 根據藥廠提供資料

- 接種復必泰後，出現心肌炎（心臟肌肉發炎）及心包炎（包圍心臟的外膜發炎）的風險會增加。這些情況可於接種後數天之內出現，主要發生於14天內。個案更常於接種第2劑疫苗後及年輕男士身上出現。接種疫苗後，請注意心肌炎及心包炎徵兆的出現，如氣促、心悸、胸口痛。一旦出現這些徵兆，請立即向醫護人員求助。

與任何疫苗一樣，接種2劑「復必泰」疫苗後可能無法保護所有接種「復必泰」的人士，亦未清楚您將受到多長時間的保護。

## 兒童

成人劑量的「復必泰」不推薦用於12歲以下的兒童。

## 其他藥物和「復必泰」

如果你正使用、最近已經使用或可能需要使用其他藥物或近期接種過任何其他疫苗，請告知您的醫生或藥劑師。



## 懷孕和哺乳

經考慮海外就懷孕及哺乳的婦女接種信使核糖核酸新冠疫苗的建議及世界各地累積相關現實的安全數據，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議她們可跟隨一般成年人的安排，接種包括第三劑在內的信使核糖核酸疫苗「復必泰」。

## 駕駛車輛和操作機器

第4節(可能的副作用)中提到的疫苗接種的某些影響可能會暫時影響您的駕駛車輛或操作機器的能力。請在這些影響消失後再駕駛車輛或操作機器。



## 「復必泰」含有鉀和鈉

本疫苗每劑含<math>1\text{ mmol}</math> (39 mg) 的鉀，即基本上「無鉀」。

本疫苗每劑含<math>1\text{ mmol}</math> (23 mg) 的鈉，即基本上「無鈉」。



L20220425

### 3 如何給予「復必泰」

- 在您上臂#肌肉內注射0.3 mL 已稀釋的「復必泰」。  
# 聯合科學委員會聯同專家顧問團尤其建議兒童及青少年可於大腿前外側中段部位進行肌肉注射。
- 您將接受**2次注射**，**至少相隔21天\***。
- 接種第1劑「復必泰」後，



您應在21天後接種第2劑**相同的疫苗**，以完成疫苗接種\*。

關於「復必泰」的使用，如還有任何疑問，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士。

\* 聯合科學委員會聯同專家顧問團建議特定人士接種額外劑數新冠疫苗(即第三劑/和第四劑)。有關詳情，請參閱補充接種須知「接種額外劑數新冠疫苗的建議」。5至17歲人士於接種第一劑復必泰疫苗至少8個星期(即56日)後應接種第二劑復必泰疫苗。2019冠狀病毒病的康復者請參閱[「曾感染 2019 冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知」](#)。



若在接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加或若你的副作用使你擔心，又或副作用似乎不會在幾天內消失，請聯絡你的醫生。

在你就醫時，請確保將接種疫苗的詳情告知醫護人員，並向他們出示你的接種疫苗記錄卡(如有)。他們會進行適當的評估，如有需要，會向衛生署呈報任何判斷為在醫學上需關注的接種疫苗後異常事件，讓衛生署採取進一步行動和評估。

請你允許醫護人員報告接種疫苗後異常事件時，在你同意下將異常事件個案和個人及臨床資料轉交衛生署以持續監察接種新冠疫苗的安全及臨床事件。